



### Technische Informationen

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Karton mit 35 Kittelfl. à 150 ml | Art.-Nr. 00635 |
| Karton mit 10 Eurofl. à 500 ml   | Art.-Nr. 00636 |
| Karton mit 10 V10 Fl. à 500 ml   | Art.-Nr. 00637 |
| Karton mit 12 Eurofl. à 1.000 ml | Art.-Nr. 00638 |
| Karton mit 6 V10 Fl. à 1.000 ml  | Art.-Nr. 00639 |

### Zubehör

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Wandspender für 1.000 ml Eurofl. | Art.-Nr. 80054 |
| Handspender für 1.000 ml Eurofl. | Art.-Nr. 88019 |

### Wirkstoffe

100 g enthalten 55,8 g Ethanol und 10,0 g 1-Propanol

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS02, GHS07

BAuA Reg.-Nr. N-85853

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0320



# CimoCid Plus



## Alkoholische Händedesinfektion, mit Rückfetter, farbstoff- und parfümfrei, begrenzt viruzid PLUS

### Einsatzbereich

Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion in medizinischen Einrichtungen in Schulen, Kindergärten und Heimen und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentlichen Einrichtungen.

### Anwendung

Einreiben in die trockenen Hände\*. Zur hygienischen Händedesinfektion Hände ausreichend mit CIMOCID PLUS benetzen und ohne Wasserzugabe 30 Sekunden nach dem Standardverfahren verreiben.

| Anwendungsgebiet/Wirksamkeit   | Konzentration/Einwirkzeit | Anmerkung                    |
|--|---------------------------|------------------------------|
| Hygienische Händedesinfektion, bakterizid und levurozid  | konz. 30 Sek.*            | VAH/DGHM, EN 1500            |
| Chirurgische Händedesinfektion   | konz. 90 Sek.**           | VAH, EN 12791                |
| Tuberkulozid (M. terrae)   | konz. 30 Sek.*            | EN 14348, hohe Belastung     |
| Mykobakterium (M. avium)   | konz. 30 Sek.*            | EN 14348, hohe Belastung     |
| Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)   | konz. 30 Sek.*            | EN 14476, hohe Belastung     |
| Begrenzt viruzid PLUS  | konz. 60 Sek.*            | EN 14476, niedrige Belastung |
| * Die Hände während der gesamten Applikationszeit durch das konzentrierte Präparat feucht halten.                |                           |                              |
| ** Die Hände und Unterarme während der gesamten Applikationszeit durch das konzentrierte Präparat feucht halten. |                           |                              |

### Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Influenza)
- Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rota-, Noro- u. Adenoviren)
- Gebrauchsfertige, alkoholische Lösung
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Besonders hautverträglich und rückfettend
- Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett
- Haltbarkeit geöffnet: 12 Monate
- VAH-gelistet
- IHO-gelistet
- HACCP-konform

### Hinweise

Flüssigkeiten und Dampf leicht entzündbar. Sicherheitsdatenblatt beachten.

pH conc 0 2 4 8 10 12 14

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
 Taunusstraße 19 · 80807 München  
 Tel. +49 89 3506080  
 info@dr-schnell.de  
 www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
 QUALITÄT UND SERVICE